

CABINET DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE CRIMEE - MANIN
RADIOLOGIE GÉNÉRALE NUMÉRISÉE - MAMMOGRAPHIE - ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE
ET OBSTÉTRICALE – ECHO-DOPPLER -
IMAGERIE DENTAIRE – OSTÉODENSITOMÉTRIE – SCANNER – IRM
CYTOPONCTIONS- BIOPSIES- INFILTRATIONS- ARTHROGRAPHIES
92 Bis, rue de Crimée - 75019 PARIS
Tel. 01 44 52 01 00 - Fax. 01 42 41 45 22

Docteur
Cathy SMADJA-TAÏEB
Ancienne interne et Chef de Clinique des Hôpitaux
de Paris
Ancienne Assistante de l'Institut Curie
75 1 50587 6
N° réseau péri-natalité : 7504113011334

Docteur
Thibaut BALME
Ancien interne des hôpitaux de
Lyon
75 1 94097 4

Docteur
Ryad ABDERRAHIM
Ancien interne des hôpitaux
De Lille
Ancien assistant des hôpitaux
Ancien attaché à l'hôpital Tenon
75 1 94548 6

INFORMATIONS AUX PATIENTS DEVANT BÉNÉFICIER DE CYTOPONCTIONS

Madame, Monsieur,

L'examen clinique ainsi que l'étude de votre échographie ont amené les médecins à vous proposer de réaliser un prélèvement.

Il sera pratiqué avec votre consentement.

Une information vous est fournie sur le déroulement de l'examen.

➤ **N'oubliez pas :**

La prescription de votre médecin (ordonnance, lettre...)

Vos examens et leurs résultats (échographie, résultats histologiques de chirurgie ou de ponctions...)

Signaler tout problème de santé sérieux et nous communiquer la liste écrite des médicaments que vous prenez.

➤ **Précautions :**

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun

Il est souhaitable de ne pas prendre d'aspirine (ou ses dérivés) durant la semaine qui précède le rendez-vous.

Les cytoponctions ne peuvent pas être pratiquées sous traitement anti-coagulant, celui-ci doit être arrêté au préalable par votre médecin traitant.

Cet examen ne nécessite pas d'arrêt de travail.

Vous ne devez pas prendre l'avion durant les 48 h qui suivent l'examen.

➤ **Après l'examen :**

Une ecchymose peut apparaître au site de ponction.

➤ **Résultats :**

Nous ne pouvons pas vous donner de résultats immédiatement. Il faut attendre les conclusions du laboratoire d'analyses. Celles-ci sont adressées par le laboratoire à votre médecin sous 10 jours.

Celui-ci est chargé de vous les expliquer et de vous en remettre un double.

➤ **Tarifcation :**

Cytoponctions : 120€

A noter, que vous recevrez une facture (ou plusieurs factures si analyses complémentaires nécessaires) du laboratoire en vue du règlement des analyses.

Docteur
Cathy SMADJA-TAÏEB
Ancienne interne et Chef de Clinique des Hôpitaux
de Paris
Ancienne Assistante de l'Institut Curie
75 1 50587 6
N° réseau péri-natalité : 7504113011334

Docteur
Thibaut BALME
Ancien interne des hôpitaux de
Lyon
75 1 94097 4

Docteur
Ryad ABDERRAHIM
Ancien interne des hôpitaux
De Lille
Ancien assistant des hôpitaux
Ancien attaché à l'hôpital Tenon
75 1 94548 6

FICHE D'INFORMATIONS

Au cours des différents examens de la glande thyroïde, certaines anomalies repérées par le médecin, peuvent nécessiter une cytoponction thyroïdienne. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cet examen.

Qu'est ce qu'une cytoponction thyroïdienne ?

La cytoponction thyroïdienne est un geste simple et bien toléré qui consiste à introduire une aiguille très fine à travers la peau jusqu'à l'anomalie détectée par le médecin pour recueillir des cellules. Les cellules recueillies sont ensuite analysées au microscope par un médecin spécialiste appelé anatomopathologiste. La cytoponction permet d'apprécier la nature bénigne ou maligne de l'anomalie et d'éviter le cas échéant une intervention chirurgicale.

La cytoponction peut être réalisée soit par un endocrinologue soit par un radiologue.

Comment se déroule l'examen ?

- Vous êtes allongé(e) sur la table d'examen.
- Le médecin repère la zone à ponctionner et le trajet de l'aiguille.
- La zone de ponction est désinfectée.
- Le médecin suit la mise en place de l'aiguille sous contrôle échographique.
- Trois ou quatre prélèvements sont généralement nécessaires.
- Les prélèvements terminés, un petit pansement est placé sur le point de ponction à conserver quelques heures.

Combien de temps l'examen dure t-il ?

- Environ 25 minutes.
- Ensuite, vous patientez en salle d'attente pendant 20 minutes afin de vérifier l'absence de complication (hématome).

Est-ce douloureux ?

Réalisée à l'aide d'aiguilles fines, la cytoponction thyroïdienne effectuée en ambulatoire est peu douloureuse. La gêne ressentie est comparable à celle d'une prise de sang.

Elle ne nécessite pas d'anesthésie locale.

Les précautions à prendre

Avant la cytoponction, veiller à :

- Ne pas prendre d'aspirine (ni ses dérivés) dans les 8 jours précédant la cytoponction.
- En accord avec le médecin traitant, arrêter tout traitement anticoagulant avant la cytoponction.
- Signaler une éventuelle allergie au latex.

Après la cytoponction, veiller à :

- Rester allongé(e) 10 minutes sur le lit d'examen et comprimer le point de ponction.
- Rester assis(e) quelques minutes avant de se lever.
- Attendre en salle d'attente 20 minutes.
- Le médecin ou l'assistante vérifiera le point de ponction avant de vous laisser partir.
- En cas de douleurs après la ponction, vous pouvez prendre du paracétamol si nécessaire mais pas d'aspirine (ni ses dérivés).



CABINET DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE CRIMEE - MANIN
RADIOLOGIE GÉNÉRALE NUMÉRISÉE - MAMMOGRAPHIE - ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE
ET OBSTÉTRICALE – ECHO-DOPPLER -
IMAGERIE DENTAIRE – OSTÉODENSITOMÉTRIE – SCANNER – IRM
CYTOPONCTIONS- BIOPSIES- INFILTRATIONS- ARTHROGRAPHIES
92 Bis, rue de Crimée - 75019 PARIS
Tel. 01 44 52 01 00 - Fax. 01 42 41 45 22

Docteur
Cathy SMADJA-TAÏEB
Ancienne interne et Chef de Clinique des Hôpitaux
de Paris
Ancienne Assistante de l'Institut Curie
75 1 50587 6
N° réseau péri-natalité : 7504113011334

Docteur
Thibaut BALME
Ancien interne des hôpitaux de
Lyon
75 1 94097 4

Docteur
Ryad ABDERRAHIM
Ancien interne des hôpitaux
De Lille
Ancien assistant des hôpitaux
Ancien attaché à l'hôpital Tenon
75 1 94548 6

Quand obtient-on les résultats ?

Le résultat de la cytoponction nécessite une analyse spécialisée. Il est communiqué au médecin ayant prescrit le prélèvement, dans un délai de deux à trois semaines. Vous pourrez alors le revoir pour faire le point avec lui.

Une nouvelle ponction peut être nécessaire

- Dans environ 20% des cas, le prélèvement du fait du nombre peu important de cellules à analyser, peut ne pas être suffisamment informatif pour un diagnostic définitif.
- Dans ces cas, une nouvelle ponction est proposée.

Cet examen comporte-t-il un risque ?

- Tout acte médical sur le corps humain comporte un risque de complication.
- Vous ressentirez peut être une sensation de tension dans le cou mais qui ne doit pas excéder quelques heures.
- L'arrêt d'un éventuel traitement anticoagulant, la finesse des aiguilles utilisées et la compression après ponction, sont généralement suffisantes pour éviter la survenue d'un hépatome.
- Cependant, si après la ponction, vous constatez un gonflement du cou, ceci peut traduire un hématome qui disparaîtra le plus souvent spontanément.
- Mais il faut néanmoins appeler :
Avant 18h, le médecin radiologue qui a réalisé l'examen au 01.44.52.01.00.